血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点

接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- 腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- 接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象のお薬

抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン
エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
バイアスピリン	アスピリン
パナルジン	チクロピジン塩酸塩
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩
エフィエント	プラスグレル塩酸塩
プレタール	シロスタゾール
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤
ブリリンタ	チカグレロル

商品名	一般名
コンプラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
エパデール	イコサペント酸エチル（EPA）
ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
アンプラーグ	サルポグレラート塩酸塩

など